

POURQUOI PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



Votre traitement SOVALDI®-OLYSIO® combine deux molécules antivirales à action directe. SOVALDI® contient le sofosbuvir, et OLYSIO® contient le siméprévir, tous deux inhibiteurs du virus de l'hépatite C (VHC). Elles sont indiquées, toujours en association ou avec d'autres médicaments, et uniquement chez l'adulte (18 ans et plus) dans le traitement de l'hépatite C chronique.

Ce traitement a pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C, et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules, ce qui permet d'éliminer définitivement l'infection de l'organisme.

SOVALDI® et OLYSIO® prescrits conjointement peuvent être associés à la ribavirine,

Ce traitement est initié et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique.

Sa durée est fonction des médicaments co-administrés, de la nature des problèmes de foie et du génotype du virus VHC. Elle peut être de 12 à 24 semaines.

BIEN PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que les médicaments aient la meilleure chance de traiter votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche, pour conseil. Conservez le(s) flacon(s) de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé :


- **de SOVALDI® :** si vous vous en rendez compte **dans les 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu ; si vous vous en rendez compte plus de 18 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

- **de OLYSIO® :** si vous vous en rendez compte **dans les 12 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre une gélule le plus tôt possible **avec de la nourriture**. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu ; si vous vous en rendez compte plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de SOVALDI® ou de

OLYSIO® : si cela fait moins de 2 heures après une prise de ce médicament, prenez un autre comprimé **avec de la nourriture**. Si vous vomissez plus de 2 heures après l'avoir pris, il est inutile de prendre un autre comprimé : attendez l'heure de la prochaine prise.

COMMENT PRENDRE SOVALDI®-OLYSIO® ?



Vous devez prendre :

- **SOVALDI®** à raison de 1 comprimé dosé à 400 mg 1 fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours, **avec de la nourriture**.
- **OLYSIO®** à raison de 1 gélule dosée à 150 mg 1 fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours, **avec de la nourriture**.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés. Ils ont un goût très amer.

Votre médecin vous dira combien de temps prendre ce traitement. Il n'est pas recommandé de réduire la dose par vous-même, ou d'arrêter le traitement, quelle qu'en soit la raison.

Si vous devez arrêter OLYSIO® pour des effets indésirables, il ne doit pas être réintroduit.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



SOVALDI® et OLYSIO® doivent être prescrits ensemble et parfois en association avec d'autres médicaments pour le traitement de l'infection à VHC. Consultez les notices des médicaments prescrits en association.

En cas d'arrêt définitif des médicaments utilisés en association, **le SOVALDI® comme le OLYSIO® ne doivent pas être pris en monothérapie**.

Informez immédiatement votre médecin si vous prenez un médicament pour le cœur et si vous présentez en cours de traitement : essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement

Si vous avez des problèmes rénaux : SOVALDI® et OLYSIO® ne sont pas recommandés si vous souffrez d'une maladie rénale sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant le traitement.

Si vous devez vous déplacer dans une région de fort ensoleillement : des mesures de protection solaire doivent être prises et l'exposition évitée. En effet, OLYSIO® associé à d'autres médicaments induit des réactions de « photosensibilité » c'est-à-dire d'intolérance au soleil. Si cela est le cas, l'arrêt du traitement peut être envisagé et une surveillance doit être effectuée jusqu'à disparition des symptômes. De même, les cabines de bronzage sont contre-indiquées pendant le traitement.

Si vous présentez une éruption cutanée : signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien. Ils vous conseilleront dans la surveillance d'une aggravation qui pourrait entraîner l'arrêt du traitement.

Si vous êtes en âge de procréer :

- Le traitement par SOVALDI® - OLYSIO® doit être évité pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer. Vous devez en parler avec votre médecin et utiliser une méthode de contraception efficace.

- Lorsque la ribavirine est prescrite en association avec SOVALDI® - OLYSIO®, les femmes et les hommes en âge de procréer ou leur partenaire sexuel doivent utiliser une méthode de contraception efficace au cours du traitement et jusqu'à 7 mois après la fin du traitement, tel que recommandé dans la notice de la ribavirine (la consulter pour plus d'informations ou parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien).

- Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément **deux** méthodes contraceptives efficaces pendant le traitement et dans les semaines qui suivent la fin du traitement.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, cette association ne doit pas être utilisée pendant l'allaitement.

Si vous avez pris ou êtes amenés à prendre d'autres médicaments : informez-en toujours votre médecin ou votre pharmacien : OLYSIO® est susceptible d'interagir avec de nombreux autres médicaments. Votre médecin aura à adapter les doses ou à vous déconseiller la prise de certains médicaments.

Si vous devez conduire : fatigue, troubles de l'attention, vertiges et vision floue ont été rapportés. Ne conduisez qu'en l'absence de ces effets indésirables.

INTERACTIONS

Avec votre SOVALDI® - OLYSIO®, vous ne devez pas prendre :

Cardiologie : Cordarone® (amiodarone)
Antiépileptiques : Tegretol® (carbamazépine), Dihydan® (phénytoïne), Gardenal®, Alespal® (phénobarbital), Trileptal® (oxcarbamazépine).
Antibiotiques : clarithromycine, télithromycine, erythromycine.
Antifongiques : Sporanox® (itraconazole), VFend® (voriconazole), Noxafil® (posaconazole), kétoconazole, fluconazole.
Immunsuppresseur : Neoral® (ciclosporine).
Médicament de la tuberculose : Rifadine® (rifampicine), Ansatipine® (rifabutine).

Médications à base de plantes : le Millepertuis sous toutes ses présentations dont Mildac®, Prosoft®, le Chardon Marie ;

Psychostimulant : Modiodal® (modafinil).

Médicament anti-inflammatoire et anti-allergique : Dectancyl® (dexaméthasone).

Ces médicaments diminuent notamment l'efficacité de SOVALDI®.

Les anti-protéases anti VHC : Victrelis® (boceprevir), Incivo® (telaprevir) sont déconseillés ;

Antirétroviraux du VIH : les spécialités contenant efavirenz, etravirine, nevirapine, darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, lopinavir /ritonavir, (fos)amprénavir, elvitegravir, cobicistat sont déconseillées ;

Interactions avec d'autres médicaments :

Prendre des antiviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (jus de pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments ou leurs génériques sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaire.

Cardiologie : Hemigoxine® (digoxine), Isorythm®, Rythmodan® (disopyramide), Rythmol® (propafénone), flécaïnide*, quinidine : **l'association avec OLYSIO® étant déconseillée, elle devra être soumise à une surveillance étroite.**

Les médicaments suivant pourront exiger une adaptation des doses :

Anti-hypertenseurs : Mono-Bi-Tildiem® (diltiazem), vérapamil, amlodipine, nifédipine, féلودipine, nicardipine,

Hypocholestérolémiant : Crestor® (rosuvastatine), simvastatine, pravastatine, atorvastatine, lovastatine

* Certains médicaments ne sont désignés que par leur Dénomination commune internationale (DCI), soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqué ici.

Pensez à consulter les notices des médicaments prescrits en association avec SOVALDI® - OLYSIO®.

Les effets indésirables les plus fréquents :

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales ;

Troubles cutanés : éruption, prurit, réaction de photosensibilité ;

Troubles du système nerveux : maux de tête, insomnies, sensations vertigineuses ;

Troubles généraux : fatigue, dyspnée (essoufflement) ;

Troubles musculo-squelettiques : douleurs dans le dos et les articulations ;

Des analyses sanguines peuvent montrer une augmentation du taux de bilirubine (signe de problème de foie).

Notes



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

« Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

www.actions-traitements.org/reglette

Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande



Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

du lundi au vendredi de 15 h à 18 h



infocarte 38

Édition juin 2016

SOVALDI®



NS5B

sofosbuvir

SOF

OLYSIO®



INHIBITEUR
DE LA PROTÉASE

simeprevir

SMV

at
actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGREEE

ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00 - Fax : 01 43 67 37 00
at@actions-traitements.org

f /actiontraitements @Association_AT

at
actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGREEE