

POURQUOI PRENDRE EPCLUSA® ?



Epclusa® est une association de 2 molécules : sofosbuvir et velpatasvir appelées « antiviraux à action directe ». Le sofosbuvir, inhibiteur de polymérase actif sur le virus de l'hépatite C (VHC) est indiqué, toujours en association avec d'autres médicaments, et uniquement chez l'adulte (18 ans et plus) dans le traitement de l'hépatite C chronique. Le velpatasvir est un inhibiteur de NS5A, protéine nécessaire à la réplication du virus de l'Hépatite C.

L'association de ces deux molécules permet l'indication de Epclusa® dans le traitement de l'hépatite C quelque soit le génotype (variété) du virus, ce qui a pour but de bloquer la multiplication du virus de l'hépatite C et d'empêcher l'infection de nouvelles cellules, ce qui permet d'éliminer définitivement l'infection de l'organisme.

Epclusa® peut être prescrit seul ou associé à la ribavirine. Le traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée varie en fonction de votre fonction hépatique et des médicaments co-administrés. Elle peut être de 12 semaines et jusqu'à 24 semaines .

BIEN PRENDRE EPCLUSA® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que le traitement ait les meilleures chances de soigner votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, ou un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des Urgences le plus proche, pour conseil. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de Epclusa® :

- si vous vous en rendez compte **dans les 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu à l'horaire habituel.
- si vous vous en rendez compte **plus de 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. Ne prenez pas une double dose.

Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de EPCLUSA® :

- si cela fait **moins de 3 heures** après l'administration, vous devez prendre à nouveau un comprimé.
- si cela fait **plus de 3 heures**, vous n'avez pas besoin de prendre un autre comprimé. La prise suivante se fera à l'heure habituelle.

Dans chacune de ces situations, pensez à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien (à l'occasion du renouvellement de votre ordonnance).

COMMENT PRENDRE EPCLUSA® ?



Vous devez prendre 1 comprimé de Epclusa® 1 fois par jour, pendant ou en dehors des repas. Votre médecin vous dira combien de temps prendre votre traitement.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués (goût amer) ou écrasés.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose, quelle qu'en soit la raison.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Epclusa® peut vous être prescrit en association avec de la ribavirine. Il peut vous être utile d'en consulter la notice.

Si vous avez des problèmes rénaux : Epclusa® n'est pas recommandé, en cas d'insuffisance rénale sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins pendant le traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques tels que la bradycardie, parlez-en avec votre médecin, certains médicaments vous seront contre-indiqués. Si vous prenez un médicament pour le cœur tel que l'amiodarone (Cordarone®) et si vous présentez les symptômes suivants en cours de traitement : essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement, informez immédiatement votre médecin.

Si vous êtes co-infectés par le virus de l'hépatite B, une surveillance renforcée de l'infection sera nécessaire. Parlez-en avec votre médecin.

Si vous êtes en âge de procréer : Epclusa® n'est pas recommandé. En cas d'association avec la ribavirine, toutes les précautions doivent être prises afin d'éviter une grossesse chez les patientes et chez les partenaires féminines des patients prenant la ribavirine. Aucune méthode contraceptive n'étant totalement fiable, il est impératif que les femmes en âge de procréer et leurs partenaires utilisent simultanément deux méthodes contraceptives

efficaces pendant le traitement et dans les 6 à 7 mois qui suivent la fin du traitement.

N'allaites pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

INTERACTIONS

Avec Epclusa, vous ne devez pas prendre* :

Antiépileptiques : Tegretol® (carbamazépine), Dihydan® (phénytoïne), Gardenal® , Aepsal® (phénobarbital).

Médicaments de la tuberculose : Rifadine® (rifampicine), Ansatine® (rifabutine).

Médications à base de plantes : le Millepertuis sous toutes ses présentations dont Prosoft®, Mildac®.



Interactions avec d'autres médicaments :

Prendre des antiviraux à action directe n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (patates douces, jus de pamplemousse...), l'alcool et les drogues récréatives.

Certains médicaments ou leurs génériques sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaire.

Cardiologie : Cordarone® (amiodarone), Hemigoxine® (digoxine) : une association avec Epclusa® étant déconseillée, elle devra être soumise à une surveillance étroite.

Traitement des brûlures gastriques : Gastropax®, Gastropulgite®, Gelox®, Maalox®, Marga®, Moxydar®, Pepsiduo®, Topaal®, Xolaam® (hydroxyde d'aluminium et/ou de magnésium). Ces médicaments peuvent modifier l'absorption de Epclusa® et doivent être pris 4 heures avant ou après.

Traitement des ulcères et des reflux gastriques : les « inhibiteurs de la pompe à protons » ou « IPP » tels que oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, ésoméprazole, doivent être pris **au moins 4h après la prise de Epclusa®** lequel sera avalé **avec de la nourriture.**

Antiépileptiques : Trileptal® (oxcarbamazépine).

Anticoagulants : Pradaxa® (dabigatran), Previscan®, Sintrom®, Coumadine®.

Hypocholestérolémiants : Crestor® (rosuvastatine), simvastatine, atorvastatine, lovastatine.

Antirétroviraux du VIH : les spécialités contenant du ténofovir, efavirenz.

* Certains médicaments ne sont désignés que par leur DCI (dénomination commune internationale), soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES



Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris ceux indiqués ici.

En cas d'association avec la ribavirine, consultez la notice pour en connaître les effets indésirables fréquemment rapportés.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants :

essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement : cela peut correspondre à un trouble du rythme cardiaque (bradycardie) sévère.

Les effets indésirables fréquents

De façon beaucoup plus fréquente, d'autres effets indésirables peuvent survenir. Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines). Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Troubles digestifs : nausées.

Troubles du système nerveux : maux de tête, fatigue.

Notes



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

« Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

www.actions-traitements.org/reglette

Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande



Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h



infocarte

45

Edition septembre 2017

EPCLUSA®

7916

NS5B

sofosbuvir

SOF

NS5A

velpatasvir

VEL



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org



/actionstraitements



@Association_AT

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

