



## POURQUOI PRENDRE UN TRAITEMENT ABACAVIR Mylan ?

Abacavir Mylan est un inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse indiqué dans le traitement de l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) chez les adultes, adolescents et enfants, **à condition de ne pas être porteurs de l'allèle HLA-B\*5701**. Cet inhibiteur est administré en association à d'autres agents antirétroviraux.

Ce traitement a pour objectif d'atteindre une charge virale indétectable en bloquant la multiplication du virus (diminution de la charge virale), d'améliorer et de préserver vos défenses immunitaires (augmentation des CD4). Ainsi, bien que vous soyez toujours porteur du VIH, le taux de virus dans le sang est si faible, que vous ne pouvez plus le transmettre par voie sexuelle. C'est ce que l'on appelle le TASP (Treatment as prevention : le traitement comme prévention).

Le traitement ARV vous protège aussi du risque d'apparition ou de rechute des maladies opportunistes. Ce sont des maladies qui s'installent quand les défenses immunitaires (CD4) sont faibles et la charge virale élevée.



## BIEN PRENDRE ABACAVIR Mylan ?

L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale (par reprise de la multiplication du VIH). De plus, votre type de virus pourrait devenir résistant à votre traitement, c'est à dire insensible à l'effet de certains médicaments, ce qui pourrait le rendre plus difficile à traiter.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une association de lutte contre le VIH/Sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

### Que faire si :

**Vous avez pris plus que la dose prescrite :** le risque de développer des effets indésirables est majoré. Dans ce cas, contactez votre médecin, votre pharmacien ou le service d'urgence le plus proche pour obtenir un avis.

**Vous avez oublié de prendre votre comprimé :** prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

INTI

ABACAVIR

ABC



## COMMENT PRENDRE ABACAVIR Mylan ?



Exemple de prise sur une journée

Abacavir Mylan doit être prescrit par des médecins expérimentés dans la prise en charge de l'infection par le VIH. Un renouvellement de la prescription par un médecin spécialiste hospitalier est nécessaire une fois par an.

Il doit être pris tous les jours, au cours ou en dehors des repas, selon les recommandations du médecin, soit sous la forme de 1 comprimé (300 mg) deux fois par jour, soit sous la forme de 2 comprimés (600 mg) une fois par jour.

Il est recommandé d'avaler le comprimé avec un grand verre d'eau sans le croquer, ni l'écraser pour garantir l'administration de la dose complète. Cependant, si vous êtes dans l'incapacité d'avaler le comprimé, il est possible de l'écraser et de le mélanger à une petite quantité de nourriture semi-solide ou liquide qui sera ingérée immédiatement après.



## ATTENTION SOYEZ VIGILANT

**L'abacavir Mylan est un médicament indiqué dans le traitement du VIH qui doit toujours être associé à d'autres antirétroviraux. Avant l'initiation du traitement, votre médecin veillera au dépistage de l'allèle HLA-B\*5701, qui contre-indique l'utilisation de l'abacavir Mylan s'il est présent.**

**Si vous avez des problèmes de foie** ou des antécédents de maladie du foie, y compris une hépatite chronique, parlez-en à votre médecin. Les patients traités par des médicaments antirétroviraux présentent un risque plus élevé de problèmes hépatiques. Votre médecin surveillera votre foie pendant la durée de votre traitement.

**Si vous avez des problèmes rénaux :** avant et pendant le traitement, votre médecin évaluera votre fonction rénale par des examens sanguins et/ou urinaires. L'abacavir Mylan ne doit pas être administré chez les patients ayant une insuffisance rénale au stade terminal.

**Si vous avez un désir de grossesse :** parlez-en à votre médecin. Vous déciderez ensemble du meilleur traitement à prendre dans ce cas particulier.

**N'allaitez pas pendant le traitement.** D'une manière générale, il est recommandé aux femmes infectées par le VIH (même traitées) de ne pas allaiter afin d'éviter la transmission du virus à l'enfant.

**Contactez immédiatement le médecin** en cas d'éruption cutanée ou si vous présentez des symptômes appartenant à **au moins deux** des catégories suivantes : fièvre / essoufflement, maux de gorge ou toux / nausées ou vomissements, ou diarrhée ou douleurs abdominales / fatigue ou courbatures sévères ou sensation de malaise général.

## INTERACTIONS



Prendre des antirétroviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance et consultez la notice systématiquement. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, l'alcool et les drogues récréatives. Si vous souhaitez vérifier une interaction, consultez notre réglette d'interactions\*\*.

Actuellement, aucune interaction cliniquement significative n'a été relevée avec l'abacavir Mylan.

Cependant, une attention particulière sera portée à l'usage de la méthadone pendant un traitement sous abacavir Mylan, afin de déceler les symptômes évocateurs d'un sous-dosage possible en méthadone.

\*\*Notre réglette d'interactions est disponible en version papier gratuitement sur notre site internet mais aussi en version numérique sur notre site internet ou en téléchargement gratuit sur Smartphone Apple et Android (AT MedInfo).

### Médicament générique : composition et excipients

Un médicament générique est identique au médicament d'origine (dit « princeps »). Il présente la même forme (gélule, comprimé, solution...) et il a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s). Le principe actif est exactement le même : présent dans la même quantité que dans le médicament d'origine, il est « bioéquivalent » (c'est-à-dire qu'il engendre les mêmes effets) et tout aussi efficace. Entre les deux médicaments, seule une chose peut effectivement différer : les composants d'enrobage, appelés excipients.

## EFFETS INDÉSIRABLES



Sans être systématique, tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des effets indésirables de gravité variable. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effets indiqués ci-dessous ou non.

**Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants :**

nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, léthargie, malaise, éruption cutanée, difficulté à respirer (dyspnée), toux, maux de tête (céphalées), douleurs musculaires (myalgie) car ils peuvent alerter sur une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir Mylan. Celle-ci peut survenir à tout moment au cours du traitement, bien qu'elle apparaisse habituellement au cours des 6 premières semaines de traitement.

### Les effets indésirables fréquents

De façon beaucoup plus fréquente, d'autres effets indésirables peuvent survenir. Ils sont bien moins graves et la plupart sont temporaires (2 à 6 semaines).

Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

**Troubles du métabolisme et de la nutrition :** anorexie.

**Affection du système nerveux :** céphalées (maux de tête).

**Affections gastro-intestinales :** nausées, vomissements, diarrhée.

**Affection de la peau et du tissu sous-cutané :** rash (éruption cutanée) sans symptômes associés (fièvre, maux de tête, etc).

**Troubles généraux :** fièvre, léthargie, fatigue.

- « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

[www.actions-traitements.org/reglette](http://www.actions-traitements.org/reglette)

- Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h

- ou par mail 7/7 :

[ecoute@actions-traitements.org](mailto:ecoute@actions-traitements.org)

- Commandez nos outils pratiques en ligne

[www.actions-traitements.org/commande](http://www.actions-traitements.org/commande)



# infocarte 53

Edition Décembre 2018

## ABACAVIR Mylan



INTI

ABACAVIR

ABC

générique



**ACTIONS TRAITEMENTS**

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

[at@actions-traitements.org](mailto:at@actions-traitements.org)

[/actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association\\_AT](https://twitter.com/Association_AT)

[/actionstraitements](https://www.instagram.com/actionstraitements)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

