

POURQUOI PRENDRE MAVIRET® ?



MAVIRET® est une association de 2 molécules, glécaprévir et pibrentasvir appelées "antiviraux à action directe", indiquée dans le traitement de l'hépatite C chronique.

Le glécaprévir est un inhibiteur de protéase NS3/4A, le pibrentasvir un inhibiteur de la protéine NS5A, ils bloquent les protéines nécessaires à la réplication du virus de l'hépatite C entraînant l'élimination de l'infection de l'organisme.

MAVIRET® est indiqué dans le traitement de l'hépatite C chronique, quelque soit le génotype (variété) du virus, uniquement chez l'adulte, sans nécessité d'associer d'autres traitements (interféron, ribavirine).

Le traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite C chronique. Sa durée varie de 8 semaines dans le cas le plus simple et en l'absence de traitements antérieurs jusqu'à 16 semaines selon le stade d'évolution de votre hépatite, du génotype et de vos antécédents de traitement.

BIEN PRENDRE MAVIRET® ?



L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative pour que le traitement ait les meilleures chances de soigner votre infection par le virus de l'hépatite C.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement ("être observant"). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin ou à un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus proche. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre vos comprimés de MAVIRET® :


- si vous vous en rendez compte **dans les 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre les comprimés le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu à l'horaire habituel ;
- si vous vous en rendez compte **plus de 18 heures** après l'heure de prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante comme prévu. **Ne prenez pas une double dose.**

Vous avez vomi après avoir pris vos comprimés de MAVIRET® :

- si cela fait **moins de 3 heures** après l'administration, vous devez prendre à nouveau la dose de 3 comprimés ;
- si cela fait **plus de 3 heures**, vous n'avez pas besoin de les reprendre. La prise suivante se fera à l'heure habituelle.

Pensez à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien (à l'occasion du renouvellement de votre ordonnance).

COMMENT PRENDRE MAVIRET® ?



Vous devez prendre 3 comprimés de **MAVIRET®** en une prise, 1 fois par jour **avec** de la nourriture.

Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués ou écrasés.

Il n'est pas recommandé de réduire la dose, quelle qu'en soit la raison.

Votre médecin vous dira combien de temps prendre votre traitement.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Si vous avez des problèmes hépatiques : MAVIRET® n'est pas recommandé, en cas d'insuffisance hépatique modérée et est contre indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction hépatique (examens sanguins) et exercera une surveillance accrue pendant votre traitement.

Si vous êtes co-infectés par le virus de l'hépatite B, une surveillance renforcée de l'infection sera nécessaire. Parlez-en avec votre médecin. Un dépistage du VHB sera effectué avant toute instauration de traitement.

Si vous êtes en âge de procréer : MAVIRET® n'est pas recommandé en cas de grossesse et est contre-indiqué lorsqu'il est associé à une contraception contenant de l'éthinylestradiol. Parlez-en avec votre médecin.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

