



POURQUOI PRENDRE ENTECAVIR Mylan ?

ENTECAVIR Mylan est un analogue nucléosidique de la transcriptase inverse, médicament antiviral indiqué dans l'infection chronique (au long cours) par le virus de l'hépatite B (VHB). Il est indiqué chez l'adulte ayant le foie altéré, fonctionnel ou non complètement fonctionnel, et chez l'enfant de 2 ans à 18 ans dont le foie est altéré mais encore fonctionnel.

Il a pour but de diminuer la quantité de virus de l'hépatite B dans votre corps, et d'améliorer l'état de votre foie.

Ce traitement est initié et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d'hépatite B chronique. Sa durée dépend de vos résultats d'analyses biologiques.



BIEN PRENDRE ENTECAVIR Mylan ?

L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prise de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative car il existe un risque d'aggravation de votre hépatite à l'arrêt du médicament.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela est votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmière) ou bien encore avec une association de lutte contre le sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter immédiatement votre médecin ou le service des Urgences le plus proche, pour conseil. Conservez le flacon de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé d'ENTECAVIR Mylan :

- vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu.
- si vous vous en rendez compte presque à l'heure de la dose suivante ne prenez pas une double dose.

Il est important de n'oublier aucune prise : des symptômes hépatiques graves peuvent apparaître. Si c'est le cas, prévenez immédiatement votre médecin.

INTI

entecavir

ETV

COMMENT PRENDRE ENTECAVIR Mylan ?



Exemple de prise sur une journée

Vous devez prendre 1 comprimé dosé à 0,5 mg ou 1 mg, une fois par jour, par voie orale, à la même heure tous les jours.

Votre dose peut varier :

- Si vous avez déjà été traité pour une infection par le VHB, selon le médicament reçu initialement,
- Si vous avez des problèmes rénaux : un recours à une dose plus faible ou ou à un espacement des prises est possible,
- En fonction de l'état de votre foie,
- En fonction du poids corporel (chez l'enfant de moins de 32.6 kg, une solution buvable est recommandée).

Selon chacune de ces situations, votre traitement peut être à prendre strictement à jeun, soit 2 heures avant et 2 heures après toute nourriture. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Ce médicament antirétroviral vous est prescrit sous un nom appelé « Dénomination Commune Internationale » ou « DCI » qui est identique dans tous les pays.

Ce médicament est aussi commercialisé sous le nom déposé de « BARACLUDGE® » dont il est le médicament générique. Il ne doit en aucun cas lui être associé.

Si vous avez des problèmes rénaux : votre médecin ajustera la posologie ou l'espacement des prises de ENTECAVIR Mylan, car celui-ci est éliminé de votre organisme par les reins.

Quel que soit le fonctionnement de votre foie, une surveillance régulière est nécessaire. Des exacerbations d'hépatite spontanées sont fréquentes en début et après l'arrêt du traitement.

Si vous êtes co-infecté par le VIH : vous ne devez pas prendre ENTECAVIR Mylan sans prendre également des médicaments pour le VIH. Parlez-en avec votre médecin. ENTECAVIR Mylan ne contrôle pas votre infection VIH.

La prise d'ENTECAVIR Mylan n'empêche pas la transmission du virus de l'hépatite B par voie sexuelle ou par les liquides biologiques (comme le sang). Prenez toutes les précautions pour ne pas contaminer d'autres

personnes. Il est conseillé de proposer un dépistage à votre entourage : vous pouvez vous documenter auprès des associations de patients, de votre médecin, votre pharmacien, etc. Un vaccin préventif est disponible pour protéger les personnes à risque de contamination.

Si vous êtes en âge de procréer : vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pour éviter toute grossesse. Si vous avez un désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin.

N'allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu. Par conséquent, ENTECAVIR Mylan ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Si vous devez conduire / utiliser des machines : fatigue, sensations vertigineuses, somnolence (envie de dormir) sont des effets indésirables fréquents et peuvent altérer votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.. Ne conduisez qu'en l'absence de ces effets indésirables.

INTERACTIONS



Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre* :

Prendre des antiviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements **. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance.

L'élimination d'ENTECAVIR Mylan étant surtout rénale, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien :

-En cas d'association avec des médicaments qui altèrent la fonction rénale, qu'ils soient prescrits ou en vente libre en pharmacie.

-En cas de traitement avec d'autres antiviraux tels que lamivudine, adéfovir dipivoxil ou le tenofovir

*Certains médicaments sont désignés par leur DCI (dénomination commune internationale), nom de la molécule active que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

**En cas de doute, notre réglette d'interactions médicamenteuses est disponible en version papier et numérique sur notre site internet mais aussi dans l'application AT MedInfo à télécharger gratuitement sur Smartphone Apple et Android.

Médicament générique : composition et excipients

Un médicament générique est identique au médicament d'origine (dit « princeps »). Il présente la même forme (gélule, comprimé, solution...) et il a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s). Le principe actif est exactement le même : présent dans la même quantité que dans le médicament d'origine, il est « bioéquivalent » (c'est-à-dire qu'il engendre les mêmes effets) et tout aussi efficace. Entre les deux médicaments, seule une chose peut effectivement différer : les composants d'enrobage, appelés excipients.

L'excipient désigne toute substance autre que le principe actif présente dans un médicament. Il n'a aucune activité pharmacologique recherchée. Tous les médicaments, génériques et princeps, ont des excipients.

Les excipients servent à faire parvenir le principe actif dans l'organisme à l'endroit où il doit agir. Ils ont un rôle dans l'absorption et la stabilité du médicament. Ils permettent ainsi une dissolution correcte. Ils conditionnent son aspect, sa couleur et son goût.

EFFETS INDÉSIRABLES



Quoique rarement rapporté, ENTECAVIR Mylan comme les autres analogues nucléosidiques peut être à l'origine d'une acidose lactique et d'une augmentation de la taille de votre foie. Si vous ressentez des symptômes tels que nausées, vomissements, douleurs du ventre, contactez immédiatement votre médecin.

Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les médicaments sont susceptibles d'en provoquer. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqué ci-après.

Les effets indésirables fréquents

Troubles du système nerveux : maux de tête, fatigue, sensations vertigineuses, insomnies, somnolence.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, dyspepsie (gêne gastro-intestinale).

Troubles hépatiques : exacerbation de l'hépatite avec augmentation des enzymes hépatiques (ALAT).

• « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »

www.actions-traitements.org/reglette

• Ligne d'écoute

01 43 67 00 00

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h

• ou par mail 7/7 :

ecoute@actions-traitements.org

• Commandez nos outils pratiques en ligne

www.actions-traitements.org/commande



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél : 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org



[/actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements)



[@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

infocarte 52

Edition Juin 2018

ENTECAVIR Mylan



INTI

entecavir

ETV

générique



actions traitements
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉÉE