EDURANT®



POURQUOI PRENDRE EDURANT®?

Edurant ® est une spécialité antirétrovirale (ARV) composée de rilpivirine (inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse). Ce traitement est indiqué, en association avec d'autres médicaments ARV, pour le traitement de l'infection par le virus

de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) chez le patient âgé de 12 ans ou plus, n'ayant jamais été sous traitement ARV et ayant une charge virale inférieure à 100 000 copies/ml. Dans cette indication, un test de résistance génotypique doit être effectué au préalable.

Edurant® est aussi utilisé en association avec d'autres médicaments ARV dans le Traitement Post Exposition (TPE).

Le TPE est un traitement de 28 jours au maximum, employé à la suite d'un accident d'exposition sexuelle ou au sang afin de limiter le risque de contamination par le VIH. C'est un traitement d'urgence qui doit être débuté idéalement dans les 4 heures suivant l'exposition et 48 heures au plus tard. Il faut pour cela s'adresser au service d'accueil des urgences ou à un service spécialisé à l'hôpital ou en ville (Service des Maladies Infectieuses et Tropicales) / CeGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic).

THE THE HIT

COMMENT PRENDRE EDURANT®?



Exemple de prise sur une journée

Edurant[®] doit être pris tous les jours, à raison de 1 comprimé une fois par jour, à heure fixe avec un repas.

Il est recommandé d'avaler le comprimé avec de l'eau, et de ne pas le mâcher ou l'écraser.

0

BIEN PRENDRE EDURANT®?

L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prises de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre

traitement de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale. De plus, le virus pourrait devenir résistant au traitement le rendant ainsi plus difficile à contrôler.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une association de lutte contre le VIH/sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

Que faire si :

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous pouvez présenter un risque accru de développer des effets indésirables liés au traitement. Contacter le plus rapidement possible un professionnel de santé (médecin, pharmacien) ou le service des urgences pour conseil. Conservez le flacon de comprimés avec vous, pour pouvoir décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé d'Edurant®:

- si vous vous en rendez compte dans les 12 heures après l'heure de prise habituelle, prenez un comprimé dès que possible avec un repas. Ensuite, prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
- si vous vous en rendez compte plus de 12 heures après l'heure de prise habituelle, ne prenez pas la dose oubliée. Attendez et prenez la dose suivante à l'heure prévue.

En cas d'oubli, vous ne devez surtout pas prendre une double dose qui augmenterait le risque d'effets indésirables sans pour autant rattraper la dose publiée.

Vous avez vomi après avoir pris un comprimé d'Edurant®:

- si vous avez vomi dans les 4 heures, prenez un autre comprimé avec un repas.
- si vous avez vomi plus de 4 heures après, vous n'avez pas besoin de prendre un autre comprimé avant le comprimé suivant à l'heure habituelle.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Edurant® est un traitement contre le VIH-1, il ne doit pas être pris avec tout autre médicament contenant les mêmes molécules.

Si vous êtes en âge de procréer : si vous avez un désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin pour adapter votre traitement et votre suivi.

N'allaitez pas pendant le traitement. En l'absence de donnée concernant le passage de l'Edurant ® dans le lait maternel, il n'est pas recommandé aux femmes vivant avec le VIH (même sous traitement) d'allaiter. Un risque pour les nourrissons ne peut être exclu.

Si vous devez conduire ou utiliser des machines : des sensations vertigineuses, de la fatigue ou des somnolences peuvent altérer vos capacités.

INTERACTIONS



Avec ce traitement, vous ne devez pas prendre*:

Anticonvulsivants: carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne.

Anti-infectieux: rifampicine, rifapentine.

Corticoïdes systémiques : dexaméthasone (sauf en prise unique).

Inhibiteurs de la pompe à protons : oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, rabéprazole. Médications à base de plantes : millepertuis.

Interactions avec d'autres médicaments

Prendre des antirétroviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance et consultez la notice. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, l'alcool et les drogues récréatives. Pour vérifier une interaction vous pouvez aussi consulter notre réglette d'interactions **.

Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin adaptera les doses si nécessaire.

Interactions avec d'autres médicaments

Analgésiques opioïdes : méthadone.

Antagonistes des récepteurs H2 : famotidine, cimétidine, ranitidine (à prendre une seule fois par jour 12 heures avant ou 4 heures après Edurant ®).

Antiacides : carbonate de calcium, hydroxyde d'aluminium, hydroxyde de magnésium (les antiacides doivent être administrés au moins 2 heures avant ou 4 heures après Edurant®).

Anticoagulants: dabigatran

Anti-infectieux: rifabutine, clarithromycine, érythromycine

Antirétroviraux : Didanosine (administrée au moins 2 heures avant ou 4 heures après Edurant®)

**Notre réglette d'interactions est disponible sur notre site internet en version papier (envoi gratuit par La Poste) et numérique, mais aussi en téléchargement gratuit sur smartphone Apple et Android sous le nom AT MedInfo.

* Certains médicaments sont désignés par leur DCI (Dénomination Commune Internationale), nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES



Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les médicaments sont susceptibles d'en provoquer à des niveaux de gravités variables. Si vous ressentez un quelconque effet et que vous en êtes trop incommodé, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris ceux indiqués ici.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants : douleurs articulaires (surtout au niveau des hanches, des genoux et des épaules), raideurs, problèmes osseux, signes d'inflammation ou d'infection.

Les effets indésirables fréquents et très fréquents (liste non exhaustive) :

Affections hématologiques : diminution du taux des globules blancs, diminution de l'hémoglobine, diminution du taux de plaquettes.

Affections psychiatriques: insomnie, rêves anormaux, dépression, troubles du sommeil, humeur dépressive.

Affections du système nerveux : céphalées, sensations vertigineuses, somnolence.

Affections gastro-intestinales: diarrhées, nausées, douleurs abdominales, vomissements, flatulences, gêne abdominale, sécheresse buccale.

Affections cutanées : éruption cutanée.

Troubles du métabolisme : diminution de l'appétit, augmentation du cholestérol, des transaminases et de la bilirubine.

Troubles généraux : fatigue.

- « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! » www.actions-traitements.org/reglette
- Ligne d'écoute lundi au jeudi de 15h à 18h
- s-traitements.org
- Commandez nos outils pratiques en ligne www.actions-traitements.org/commande









INNTI

rilpivirine

RPV



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS Tél : 01 43 67 66 00 at@actions-traitements.org

📝 /actionstraitements 🔰 @Association_AT

♂ /actionstraitements
▶ Actions Traitements

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas expansifé n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La théraneutique change rapidement uustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rap osant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

