


TROGARZO®



POURQUOI PRENDRE TROGARZO® ?

Trogarzo® est une spécialité antirétrovirale (ARV) composée d'ibalizumab (anticorps monoclonal de l'immunoglobuline G). Ce traitement est indiqué, en association avec d'autres médicaments ARV, pour le traitement de l'infection chez l'adulte par le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) multirésistant. Trogarzo® est employé lorsqu'il est impossible d'établir un autre traitement antirétroviral efficace.

COMMENT PRENDRE TROGARZO® ?

Trogarzo® se présente sous forme de perfusion à diluer. Il est administré par voie intraveineuse par un professionnel des soins de santé. La dose recommandée de Trogarzo® est une dose de charge unique de 2000 mg suivi d'une dose d'entretien de 800 mg toutes les deux semaines.



BIEN PRENDRE TROGARZO® ?

L'efficacité de votre traitement est maximale si vous respectez bien les horaires et les recommandations de prises de vos médicaments. Il est important de ne pas stopper votre traitement de votre propre initiative. Une interruption, même sur une courte période, pourrait entraîner une augmentation de votre charge virale. De plus, le virus pourrait devenir résistant au traitement le rendant ainsi plus difficile à contrôler.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela devait être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé (pharmacien, infirmier) ou bien encore avec une association de lutte contre le VIH/sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations d'éducation thérapeutique.

Que faire si :

Vous avez oublié de vous rendre à votre rendez-vous pour l'administration de Trogarzo® :

- si l'administration de la dose d'entretien (800 mg) peut être faite dans les 72 heures après l'heure habituelle, le protocole restera inchangé.

- si l'administration de la dose d'entretien (800 mg) ne peut être faite dans les 72 heures après l'heure habituelle, une dose de charge (2000 mg) doit être administrée aussitôt que possible. Les doses d'entretien (800 mg) seront ensuite reprises toutes les deux semaines à compter de cette date.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT



Trogarzo® est un traitement contre le VIH-1, il ne doit pas être pris avec tout autre médicament contenant les mêmes molécules.

Si vous êtes en âge de procréer : si vous avez un désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin qui adaptera votre traitement et votre suivi.

N'allaitez pas pendant le traitement. En l'absence de donnée concernant le passage de Trogarzo® dans le lait maternel, il n'est pas recommandé d'allaiter pendant le traitement. Un risque pour l'enfant ne peut être exclu.

Si vous devez conduire ou utiliser des machines : des sensations vertigineuses, de la fatigue ou des nausées peuvent altérer vos capacités.



INTERACTIONS

Prendre des antiviraux n'est pas anodin, ils sont susceptibles d'interagir avec d'autres traitements. De par son mécanisme d'action et son élimination, Trogarzo®, ne devrait pas faire l'objet d'interactions médicamenteuses pharmacocinétiques. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance.



EFFETS INDÉSIRABLES

Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les médicaments sont susceptibles d'en provoquer. Si vous ressentez un quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqués ici.

Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes suivants : douleurs articulaires (surtout au niveau des hanches, des genoux et des épaules), raideurs, problèmes osseux, signes d'inflammation ou d'infection.

Les effets indésirables fréquents et très fréquents

Ils sont bénins et la plupart sont temporaires. Si vous ressentez l'un de ces effets (liste non exhaustive) et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.

Affections du système nerveux : vertiges, maux de tête, paresthésie.

Affections gastro-intestinales : diarrhées, nausées, vomissements.

Affections cutanées : éruption cutanée (apparition entre 1 et 3 semaines après la 1^{ère} dose), dermatite, sécheresse cutanée.

Troubles généraux : fatigue.

- « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »
www.actions-traitements.org/reglette

- Ligne d'écoute
01 43 67 00 00
lundi au jeudi de 15h à 18h

- ou par mail 7j/7 :
ecoute@actions-traitements.org

- Commandez nos outils pratiques en ligne
www.actions-traitements.org/commande

Évaluer nos outils



infocarte 63

Version 2021

TROGARZO®



INHIBITEUR
DE FUSION

Ibalizumab

IBA



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org

[/actionstraitements](https://www.facebook.com/actionstraitements) [@Association_AT](https://twitter.com/Association_AT)
[/actionstraitements](https://www.instagram.com/actionstraitements) [Actions Traitements](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d'Actions Traitements, association de patients. Il n'est pas exhaustif : n'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.

